2009年度 微分積分学I 期末試験 NO. ②
(玉木) DATE ・ ・

4. 次の関数の極値を求めよ。

$f(x) = e^{-x}\sin x$

(解) $f'(x) = \dfrac{\cos x - \sin x}{e^x}$ $f'(x)=0$ を満たすのは、$\cos x - \sin x = 0$ のときの x

すなわち、$\sqrt{2}\cos\left(x+\frac{\pi}{4}\right)=0$ $\therefore x = \frac{\pi}{4}+2n\pi,\ \frac{5}{4}\pi+2n\pi$ (n:整数)

ここで $0 \leqq x \leqq 2\pi$ において増減表をつくると、

x	0	…	$\frac{\pi}{4}$	…	$\frac{5}{4}\pi$	…	2π
$f'(x)$		+	0	−	0	+	
$f(x)$		↗		↘		↗	

よって、 $x = \frac{\pi}{4}+2n\pi$ のとき 極大値 $f\left(\frac{\pi}{4}+2n\pi\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}e^{-\left(\frac{1}{4}+2n\right)\pi}$

$x = \frac{5}{4}\pi+2n\pi$ のとき 極小値 $f\left(\frac{5}{4}\pi+2n\pi\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}e^{-\left(\frac{5}{4}+2n\right)\pi}$

(n:整数) //

5. 関数 $f(x,y) = x^2+y^2+3xy-2y$ の極値を求めよ。

(解) $f(x,y)$ の偏導関数 f_x、f_y は、

$$\begin{cases} f_x = 2x+3y \\ f_y = 2y+3x-2 \end{cases}$$

$f_x=0$, $f_y=0$ のとき、$x=\frac{6}{5}$, $y=-\frac{4}{5}$

次に、$f(x,y)$ の2階偏導関数 f_{xx}, f_{xy}, f_{yx}, f_{yy} は、

$f_{xx}=2$、 $f_{xy}=f_{yx}=3$、 $f_{yy}=2$ となる。

ここで、$f_{xx}=A$、$f_{xy}=B$、$f_{yy}=C$ とおくと、

$B^2-AC = 3^2-2\cdot 2 = 5 > 0$ となり、

$B^2-AC>0$ なので、 $f(x,y)$ は極値を持たない //

(参考) (教) P.118 定理5.3 の2変数関数の極値を参考にしてください。

($A=f_{xx}(a,b)$、$B=f_{xy}(a,b)$、$C=f_{yy}(a,b)$ として $H=B^2-AC$ が判別式となる)