

◆ ビブリオ科 Vibrionaceae

ビブリオ科はすべてに運動性がある。ビブリオとは vibration の意。

多くの種は好塩性で海水や河川水に生息し、魚介類からも分離される。

◎ ビブリオ属 Genus Vibrio

○ コレラ菌 Vibrio cholerae

インド、フィリピンが多い
昨年12人 (11人が輸入例、1人が国内例)
- 昨年1人 (輸入例、国内例が半々)

V. cholerae は1つの型の H 抗原と多数の型の O 抗原が知られている。「コレラ」はコレラ毒素を産生する V. cholerae O1 及び O139 によるものと定義されている。

かつてコレラは、コレラ毒素を産生する O1 型コレラ菌にのみ適用されていた。一方、O1 型以外を非 O1 コレラ non-O1 V. cholerae と呼ぶ。1992 年 インドのマドラスに発生した非 O1 コレラ菌は、コレラ毒素を産生し、新しい O 抗原を有することから、V. cholerae O139 Bengal と命名され、1999 年 4 月より施行された感染症法で 2 類感染症に位置づけられた (2007 年 4 月 3 類感染症に移行)。非 O1 非 O139 コレラ菌は、O1 ならびに O139 の抗血清で凝集しないので非凝集ビブリオ non agglutinable vibrio [NAG vibrio] と呼ばれている。
ナグビブリオ

コレラ、チフスなど

O1 コレラ菌はその生物学的性状の違いにより、

強 アジア型コレラ菌 asiatic cholera vibrio

弱 エルトール型コレラ菌 El Tor cholera vibrio ← 現在のメイン

に分けられる。

2.24% の致死率 (現在)

また、O1 型コレラ菌は O 抗原に対する抗血清により

小川型 (Ogawa)

稲葉型 (Inaba)

彦島型 (Hikoshima) ← まずみ型

の 3 つの亜型に分かれる。

Vibrio cholerae O1 El Tor Ogawa のように表示される。

コレラはコレラ毒素 (cholera toxin) 産生株によって起こる急性胃腸炎である。典型的な症状は激しい小腸性下痢と嘔吐、それに伴う脱水である。国内では軽症例が多いが、胃切除者、制酸薬服用者では重症化しやすい。

コレラ菌の抵抗力は比較的弱く、55 °C 30 分、健康人の胃液中で (数秒で?) 死滅する。

フケン

DUKORAL (不活型: 2年有効)

飲み薬

病原性大腸菌 ETEC (=3ヶ月有効)

85~94% に有効

毒素型 E. coli