

1) ATL

A) ① 母乳 ② 夫から妻への性行為 ③ 胎盤を通じて

B) 母乳を与えるのも3ヶ月までにし、それ以降はミルクを使う。

・凍結母乳を使う

注意すべき点) 親の意志も尊重すること

・"ワーク"が必要

2) ワクチンについて

A) 1回だと 腸内ウイルスの干渉が生じやすく、

1, 2, 3 回それぞれ1株になるべく均等に免疫をつける必要があるため

・二類感染症

B) MRワクチンは生ワクチンなので 母体からの 移行抗体 によって  
ブロックされてしまう。12ヶ月までは母体からの移行抗体は  
ほぼ確実になくなっている ので 生後12ヶ月からの接種である。

3) 500, 医療費, 351~500, 350, 妊婦, HIV関連腎症<sub>保険者</sub>

・B型肝炎併発者, NRTI, NNRTI, 1, PI, 1, NRTI,  
INSTI, 0.3, 3, 30, 2, 3, 2時間, 4週間)

a) 薬剤耐性ウイルスの出現がある

b) 耐性ウイルスの出現により、使用できる薬剤の幅が減り、  
副作用がきつくなってしまっていることがある

c) 抗HIV抗体を使う, 母乳を与えない, 帝王切開する

4) a) ノズル

b) 薬の分子量が大きく外膜のポアールを通れないから

c) 細菌性気管支炎

d) 陽: MSSA, S. pyogenes, 咽頭採取等(?)

陰: E. coli,

5) ノズル