

第4回目(10/24)ミニテスト

問1 Randomized controlled trial に関する説明について誤っているものを1つ選びなさい。

- a. 治療薬の有効性評価等に使われる。
- b. 疫学調査研究のひとつである。
- c. 対象者は無作為に抽出される。
- d. ランダム化比較試験のことを指す。
- ☒ e. 倫理的問題は伴うことはまれである。

問2 Intelligence Quotient(IQ)、Developmental quotient(DQ)に関する説明について誤っているものを1つ選びなさい。

- a. IQ とは知能検査の結果を示す。
- b. 知的障害では IQ70~75 を下回る。
- ☒ c. 発達指数 (DQ) はより高年齢で利用される。
- d. 平均値は 100 である。
- e. 発達指数 (DQ) は知能以外に運動、対人関係、日常生活における発達等も含めてみるもので、より低年齢で利用される。

問3 前回提示の論文 (Cognitive Recovery in Socially Deprived Young Children: The Bucharest Early Intervention Project) の内容として誤っているものを選べ。

- a. この調査においては生後2歳までに里親養育が開始されるとその効果が最大となっていた。
- b. ルーマニアにおける施設養育の子どもたちに知的な遅れ(境界域も含む)がみられた。
- c. ルーマニアにおいては施設養育から里親養育へ移行となった子どもに認知機能の回復がみられた。
- ☒ d. この研究は外国の大学研究機関が中心となり実施されたが、ルーマニアの社会的養護に対しては社会保障制度の違いから何も影響を与えなかった。
- e. この調査においては施設の代替となる里親とそれを支える専門家、サービスまで含めてシステムづくりを進められた。

問4 前回提示の論文 (Cognitive Recovery in Socially Deprived Young Children: The Bucharest Early Intervention Project) の中では子どものための施設の状況は国によって、また国内でも様々であるが、多くは共通した特徴を持つとしている。その特徴として以下の選択肢で当てはまらないものを選びなさい。

- ☒ a. 集団生活により社会性が身につくやすい。
- b. ケア提供者の個々の子どもに対する(適切な)反応が少ない。
- c. ケア提供者の子どもに対する割合が低い。
- d. 生活が厳密にルーチン化されている。
- e. 感覚や認知、言葉の刺激が少ない。