

2/1 Wed

薬理学試験問題 (安原)

(この問題用紙は持ち帰ってよい)

[問1~3] 次の文章の()内に当てはまる最も適切な語句を下欄のa~eから選び、記号を解答欄に書け。
日本では(問1)の規制により、医薬品の製造・販売には(問2)の承認が必要とされる。(問1)に基づき制定される(問3)には、日本で使用される主要な薬物の規格が示されている。
a. 厚生労働大臣、b. 内閣総理大臣、c. 日本薬局方、d. 医療法、e. 薬事法

[問4~6] 左記の基準(ガイドライン)が対象とするものを右の欄から選び、記号を解答欄に書け。
問4 GCP a. 医薬品の製造管理、品質管理
問5 GLP c. 医薬品の流通管理
問6 GMP a. 医薬品の前臨床試験

d. 医薬品の臨床試験
e. 医薬品の製造販売後調査

[問7~10] 左記の薬物分類にあてはまる薬物を右の欄

(a~e)から一つ選び、記号を解答欄に書け。
問7 麻薬 c. シスプラチン
問8 覚醒剤 c. エコナ
問9 向精神薬 a. プロプラキシル
問10 毒薬 d. プレリルグアイン

e. モルヒネ

問11 薬物の消化管吸収について正しいものはどれか。

- a. 主要な吸収部位は胃である
- b. 水溶性の高い薬物の方が吸収されやすい
- c. 分子量の大きい薬物の方が吸収されやすい
- d. 食前よりも食後投与の方が吸収されやすい
- e. 弱酸性薬物は低いpHの方が吸収されやすい

問12 主としてチクロムP-450で代謝されて体内から消失する薬物はどれか。

- a. テオフィリン、b. ペニシリン、c. モルヒネ、d. レボフロキサシン、e. インスリン

問18 薬物血中濃度を測定しながら治療に用いる薬物はどれか。

- a. フカルボース、b. ジギキシン、c. オメプラゾール、d. エリスロマイシン、e. プルフラリン

問14 妊婦に対して薬物を投与する時に、胎児の催奇形の絶対過敏期はどれか。

- a. 受精前から妊娠3週末
- b. 妊娠4週から7週末
- c. 妊娠8週から15週
- d. 妊娠16週から分娩まで

問16 加齢による薬物動態の変化で正しいのはどれか。
a. 薬物の吸収速度は速くなる
b. 肝臓の代謝機能は上昇する
c. 腎臓の排泄速度は遅くなる
d. 薬物の血中半減期は短くなる
e. 血中のタンパク結合率は増加する

[問16~20] 次の文章の()内に当てはまる最も適切な語句を下欄のa~eから選び、記号を解答欄に書け。
アトピナリンは、心臓では主に(問16)を介して興奮作用を示す。血管では、細動脈は(問17)を介して(問18)する。気管支平滑筋は(問19)を介して(問20)する。
a. α_1 受容体、b. β_1 受容体、c. β_2 受容体、d. 収縮、e. 弛緩

問21 次の文章のうち、正しいものはどれか。
a. アトピンはコリン作動性薬物である
b. アトピンはコリンエステラーゼを阻害する
c. アトピンは緑内障の治療に用いる
d. スコポラミンはアトピンに拮抗する
e. スコポラミンは乗り物酔いの予防に用いる

[問22~26] 左記の酵素を阻害する薬物を右の欄から一つ選び、記号を解答欄に書け。
問22 炭酸脱水素酵素 c. a. イソプロパミド
問23 シクロオキシゲナーゼ b. アロプリノール
問24 コリンエステラーゼ c. ネオスチグミン
問25 HMG-CoA還元酵素 d. シンバスタチン
問26 キサンチン酸化酵素 e. テンタザミド

[問27~31] 左記の受容体を遮断する薬物を右の欄から一つ選び、記号を解答欄に書け。
問27 AT_1 受容体 c. a. メトクロプラミド
問28 D_2 受容体 a. b. シメチジン
問29 H_1 受容体 c. c. ジクエチン
問30 H_2 受容体 b. d. グラニセトロン
問31 5-HT₃受容体 d. e. ロサルタン

問32 アルツハイマー型認知症に用いる薬物はどれか。
a. イミプラミン、b. フネペジル、c. 炭酸リチウム、d. フルボキサミン、e. レボドパ

<次頁あり>