

16 糖尿病の合併症の記載で正しいのはどれか？

- (1) 神経障害ではしびれ感などの感覚異常ではなく、運動麻痺が主体である。
- (2) 網膜症では単純性網膜症の段階から急速に視力低下が出現する。
- (3) 腎症の早期発見のためには尿たんぱくの検出が重要である。
- (4) 動脈硬化症の進展阻止には血糖のみならず、脂質、血圧管理が重要である。
- (5) 足病変と神経障害に関連性はない。

a (1)、(2) b (1)、(5) c (2)、(3) d (3)、(4)
e (4)、(5)

17 糖尿病患者の食事・運動指導について正しいのはどれか？

- (1) 肥満患者では現在の体重に基づき総カロリーを設定する。
- (2) インスリン注射時には、過食にはインスリン増量で対応する。
- (3) 炭水化物を極端に制限することで血糖コントロールが容易になる。
- (4) 適切なカロリー制限と栄養のバランスがとれた規則正しい食生活が重要である。
- (5) 運動は適度な有酸素運動が基本である。

a (1)、(2) b (1)、(5) c (2)、(3) d (3)、(4)
e (4)、(5)

18 1型糖尿病につき正しいのはどれか？一つ選べ。

- (1) 1型糖尿病は肥満が誘因となる。
- (2) 1型糖尿病は糖尿病全体の約50%を占める。5%以下
- (3) 1型糖尿病ではインスリン治療が必須である。
- (4) 1型糖尿病では食事療法は不要である。
- (5) 1型糖尿病では中年以降の発生が多い。小児～思春期

19 ()に正しい言葉をいれなさい。

- (1) 消化性潰瘍のなかで、空腹時に痛みが増強するのは(十二指腸潰瘍)である。
- (2) 胆石症の診断には非侵襲的な(腹部超音波検査)が用いられる。
- (3) 急性膵炎に対して()制限食とする。

次頁あり