

10) 採血で正しいのはどれか。

- a. 駆血帯は強く巻くほど良い
 b. 抜針は駆血帯を外してから行う
 c. 血管が怒張しない場合は冷罨法を行う
 d. 抜針後は採血部位をよく揉む

11) 採血後に針刺し事故を起こした時に最初に取りべき行動はどれか。

- a. 大量の流水で針刺し部位を洗浄する
 b. 採取した血液の感染性を確認する
 c. 針刺し部位を消毒薬に浸す
 d. 直ちに抗 HIV 薬を内服する

12) スタンダードプリコーションの対象となるものはどれか。

- a. 頭髮
 b. 汗
 c. 傷のない皮膚
 d. 粘膜

13) 飛沫感染予防策が必要な疾患はどれか。

- a. MRSA
 b. 麻疹
 c. 結核
 d. 水痘

14) 院内感染の予防で誤っているのはどれか。

- a. 浸出液は感染源と考える
 b. 複数の患者の創傷処置を行う場合は患者ごとに手袋を交換する
 c. 滅菌手袋を着用して浸出液に触れた場合の手洗いは不要である
 d. 飛沫核感染をする可能性がある場合は個室に隔離する

15) 入浴の回避事項とその根拠との組み合わせで誤っているのはどれか。

- a. 食後 1 時間以内の入浴 ————— 消化管血流量の減少
 b. 浴槽からの急激な立ち上がり ————— 脳血流量の減少
 c. 脱衣所と浴室との大きな温度差 ————— 血圧の急激な変動
 d. 長時間の入浴 ————— 細胞内液量の減少

16) 左前腕に持続点滴静脈内注射中の患者の寝衣交換で正しいのはどれか。

- a. 右側の袖から脱がせる
 b. 袖口から輸液ボトルを入れて着せる
 c. 右側の袖から着せる
 d. 輸液ボトルは心臓部より低く保つ

17) 褥瘡予防で誤っているのはどれか。

- a. 寝衣のしわを除去する
 b. 皮膚を清潔に乾燥させる
 c. 低栄養の食事
 d. 体位変換は頻回に行う

18) 身長 160cm 体重 85 kg の 22 歳の人の BMI(体格指数)で正しいのはどれか。

- a. $85 \div (1.6 \times 1.6)$
 b. $(85 \times 0.9) \div (1.6 \times 1.6)$
 c. $(85 \times 85) \div 160$
 d. $(85 \times 22) \div (160 - 110)$

氏名

氏名

次頁あり

231