

基礎看護学演習 II

- 34) 陰部洗浄の実施で正しいのはどれか。
- 腰部の安静の患者には行わない
  - 湯の温度は手先で確認する
  - ④ 陰唇から肛門にかけて洗う
  - 無菌操作で行う

- 35) 患者の状態と寝衣の要件との組み合わせで適切なのはどれか。

- ① 同一体位で臥床中の患者 前開きのもの
- 発熱がある患者 気密性のあるもの
- 尿失禁がある患者 撥水性に富んだもの
- 手指に運動機能障害がある患者 紐で留めるもの

- 36) 図で仰臥位から左側臥位への体位変換が最も少ない力ができるのはどれか。

- a. b. c. d.



- 37) 静脈内注射で誤っているのはどれか。

- 実施前には石けんと流水で手を洗う
- 注射部位より 5~10cm 中枢側に駆血帯を巻く
- ④ 皮膚に対して約 60° の角度で針を刺入する
- 刺入後血液の逆流を確認する

- 38) 廃用性症候群の予防で正しいのはどれか。

- a. 安静臥床      b.  関節可動域訓練      c. 水分制限      d. 温罨法

- 39) 上腕での血圧測定について誤っているものはどれか。

- ① 血圧測定で減圧する際、1 抽動あたり 10mmHg の速さで排気弁を開放する
- マンシエット内部にあるゴム嚢の中央が上腕動脈の上に当たるようにまく
- マンシエットは心臓と同等の高さになるようにする
- マンシエットの下縁は肘の 2~3cm 上に、指 2 本が入るようにゆとりを持ってまく

24  
260  
1440

- 40) 成人用の輸液セットを用いて 2000ml の輸液を 24 時間で点滴する場合 1 分間に約何滴か。

- a. 約 15 滴/分      b. 約 18 滴/分      c.  約 21 滴/分      d. 約 24 滴/分

$$15 \times 2000 = 24 \times 60$$

$$\Rightarrow 20.8$$

$$\begin{array}{r} 15 \\ 2000 \\ \hline 30000 \\ 144 \quad 440 \\ \hline 30000 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 25.6 \\ 3000 \\ \hline 144 \quad 25.6 \\ 2000 \\ \hline 54.4 \end{array}$$

234

次頁あり