

- 32 c GOD…肝細胞などの細胞が破壊された時に血液中に流出
WBC…白血球
アルブミン…濃度が低下すると栄養失調が疑われる
CRP…体内で炎症反応や組織破壊が起きているときに現れる
- 33 a 温めることで腸管への刺激を少なくし、消化を助けている。
- 34 c
- 35 a 同一体位で臥床している患者は、四肢の動きに制限や障害があると考えられ、寝衣の交換は前面介助を要することが考えられる。その場合には、体位交換とともに交換しやすい形態の前開きの寝衣が適している。
- 36 d 患者とベッドの接する基底面積をより小さくすることで、摩擦力が少なくなり移動しやすくなるため、両足を屈曲させ体幹により近づけたdが適切である。
- 37 c 針の刺入角度は15~20度である。
- 38 b 筋力低下、関節拘縮を予防する。
- 39 a
- 40 c 1分間の滴下数=
$$\{1\text{mlの滴数} \times \text{必要な輸液量(ml)}\} \div \text{指示所要時間(分)}$$
- 41 d
- 42 c 湯たんぽは、金属製 80℃、ゴム製 60℃のお湯を3分の2入れ皮膚から10cm以上離す。
- 43 a
- 44 d
- 45 b
- 46 b 尿道瘻孔は、尿道壁が圧迫壊死を起こすことにより尿道周囲炎や膿瘍形成が起こり形成される。圧迫壊死は、カテーテルの下方固定や同位置長期留置によって尿道が圧迫されて起こりやすいため、左右上腹部に交互固定する。
- 47 c 挿入は4~6cm
- 48 d
- 49 d ア…腋窩神経、イ…尺骨神経、ウ…坐骨神経、エ…坐骨&上殿&下殿神経を避ける。
- 50 b
a…26、27G
c…45° または 90°
d…×長さ→○形

お疲れさまでした!! 前期の範囲も含まれているので、
前期のシケタイにも目を通しておくと良いかもしれません。
テスト頑張ってください!!