

17. 次の薬剤のうち、副作用として精神症状を呈する可能性があるのはどれか。正しいものを1つ選んで下さい。

- a) 副腎皮質ホルモン(ステロイド)
- b) インターフェロン
- c) 降圧薬
- d) 抗ヒスタミン薬
- e) 上記の薬剤は全て起こりうる

18. 精神疾患患者の興奮と暴力について正しいものを2つ選んで下さい。

- a) 興奮状態の背景には被害妄想からくる脅えのある場合が多い。
- b) 引きこもりと親への暴力があった患者は、入院後に興奮し暴力的となりやすい。
- c) 興奮状態の激しい患者は、刺激しないようにそっとしておくのがよい。
- d) 緊張病性の興奮は、説得によっておさまることが多い。
- e) 躁病性興奮は、行動制限によって怒りを誘発されることがある。

19. 看護師が患者から受ける暴力への対処について、誤っているものを2つ選んで下さい。

- a) 患者に対する病状の評価が大切であり、それに関しては医師が的確に行い、最終的な判断も医師が行う。
- b) 暴力の誘因には、活動が制限されがちな閉鎖環境、スタッフの人員的・技術的な不足など、環境因子によるものがある。
- c) 患者だけでなくスタッフの安全も優先されなければならないため、隔離や身体拘束によって早急に対処しなければならない。
- d) 患者への治療・援助内容は全て暴力の予防に関連していることから、スタッフへの専門的教育、事後の当該スタッフへの支援など、組織的な取り組みが責務である。

20. 精神科医療における多職種チームアプローチについて、誤っているものを2つ選んで下さい。

- a) 適切なリーダーシップの機能のため、各職種の権限を尊重することが大切である。
- b) チーム内では、役割の明確化と公平な分業により、効率的な活動を行うのが望ましい。
- c) 患者に適切な援助を提供するためには、定期的なミーティングは欠かせない。
- d) 患者への援助に関する決定権についての担当者は特定せず、メンバーが統一された対応ができることが望ましい。

次頁あり