

5. 統合失調症の症状について、正しいものを2つ選んで下さい。
- a) 無為、自閉などの症状は、統合失調症の陽性症状といわれている。
  - b) 妄想着想や妄想気分は、統合失調症の初期に多い。
  - c) 統合失調症の緊張型に見られる昏迷は、意思の発動が障害された状態である。
  - d) 統合失調症による幻覚の中で、もっとも多いのは幻視である。
  - e) 統合失調症の精神症状は、知覚障害と思考障害が主で、感情障害は稀である。
6. 統合失調症によく見られる思考障害を2つ選んで下さい。
- a) 滅裂思考    b) 迂遠    c) 思考制止    d) 連合弛緩    e) 観念奔逸
7. 統合失調症の診断で入院後1ヶ月目の患者が、「この頃立ちくらみがするのは、変な薬を飲まされているからではないかと思う」と訴えた場合、あまり関係のないものを2つ選んで下さい。
- a) 被害妄想がみられる。
  - b) 薬物療法の副作用が生じている。
  - c) 体感幻覚が生じている。
  - d) 治療への疑問や主治医への不信感が芽生えかけている。
  - e) 緊張による不安症状が強まっている。
8. うつ病患者からよく聞かれる訴えを2つ選んで下さい。
- a) 自分の考えが他人に知られてしまう。
  - b) うまくいかなのはすべて、自分のせいのように思える。
  - c) 周囲の環境が不気味な感じに受け取れ不安を覚える。
  - d) 考えが途中でぶつ切り切れてしまう。
  - e) 毎日の生活に生き生きとした充実感を抱けない。
9. うつ状態について、正しいものを2つ選んで下さい。
- a) うつ病の症状は気分の変動なので、認知の歪みを生じることはない。
  - b) 怒りを抑圧すると無力感を經由してうつ状態に至ることが多い。
  - c) うつ病患者の自殺企図は、うつ状態のもっともひどい時期に多い。
  - d) うつ状態の初期や症状が軽度の場合には、軽い運動や趣味の活動が症状の軽減に役立つ。
  - e) うつ状態の患者に、希死念慮があるかどうかを尋ねることは避けた方がよい。
10. てんかんの症状と治療法について、正しいものを2つ選んで下さい。
- a) 若年期に発症し、特別の外的要因が認められないてんかんは、症候性と分類される。
  - b) 単純部分発作は意識障害を伴わない。
  - c) 欠伸発作(小発作)は、子供に見られる1分程度の意識消失発作である。

次頁あり