試験問題番号 9

言葉の定義で間違っているのはどれか。

- 1 プレホスピタルケアは病院前救護ともいう。
- 2 AEDを公共の場所や多くの人が利用する場所にくまなく設置して、いつでも除細動が使用できるようにすることをPAD (public access defibrillation)という。
- 3 病院外で救急救命士などが医療行為を実施する場合に、医師が指導、助言をして、医行為の質を保証することをメディカルコントロールという。
- 4 気道確保の手技で一般市民に対しては下顎挙上法が推奨されている。
- 5 口咽頭エアウエイは意識がなく咳など上気道の反射がない患者に対して口から挿入する補助器具である。

試験問題番号 10

AEDの操作順に関する文章で正しいのはどれか。

- a 器械の指示に従い放電ボタンを押す
- b 電源ボタンを押す
- c 電極パットを貼る
- d 器械が自動的に解析を始める
- e 適応があれば自動的に充電される
- $1 c \Rightarrow b \Rightarrow d \Rightarrow a \Rightarrow e$ $2 b \Rightarrow c \Rightarrow d \Rightarrow e \Rightarrow a$ $3 c \Rightarrow b \Rightarrow d \Rightarrow e \Rightarrow a$
- $4 c \Rightarrow b \Rightarrow e \Rightarrow d \Rightarrow a$ $5 b \Rightarrow c \Rightarrow e \Rightarrow d \Rightarrow a$

試験問題番号 11

ショックに関する文章の中で間違いはどれか。

- 1 出血性ショックは循環血液減少性ショックである。
- 2 心筋梗塞は心原生ショックをおこす。
- 3 神経原性ショックは血液分布異常性ショックを起こす。
- 4 アナフィラキシーショックはⅡ型アレルギーによるショックである。
- 5 感染性ショックでは血管抵抗は低下している。

①試験問題番号 12

SIRSの項目に含まれる組み合わせを選択せよ。

- a 体温<36℃
- b 脈拍数>90回/分
- c PaCO₂<32torr
- d WBC < 12000/mm³
- e 呼吸回数<15回/分
- 1. a, b, c 2. a, b, e 3. a, d, e 4. b, c, d 5. c, d, e

試験問題番号 13

ショックに関する文章の中で間違いはどれか。

- 1 アナフィラキシーショックでは初期か著名な呼吸困難症状が起きる。
- 2 外傷患者の一次性ショックは激痛や驚愕などの要因でおきる副交感神経の緊張により受傷 直後におきる。
- 3 ショックが遷延すると血圧は低下する。
- 4 敗血症性ショックの初期は心拍出量は低下している。
- 5 ショックの患者では動脈血液中の乳酸値は上昇する。

試験問題番号 14

ARDSに関する文章の中で正しいものはどれか

- a $PaO_2/FiO_2 \leq 200$ mmHg
- b ARDSの死亡率は50%程度である。
- c 胸部レントゲン写真では広範なすりガラス様陰影が見られる。
- d ARDSの原因で最も多いのは外傷である。
- e 肺動脈楔入圧 >18mmHg
- 1. a. b. c 2. a, b, e 3. a, d, e 4. b, c, d 5. c, d, e

試験問題番号 15

急性心不全に関する文章の中で正しいものはどれか。

- a 易疲労感は左心不全で特徴的症状である。
- b 過剰心音(Ⅲ音、IV音)は右心不全で特徴的症状である。
- c 呼吸不全は左心不全で特徴的症状である。
- d 起坐呼吸は左心不全で特徴的症状である。
- e 右季肋部痛は右心不全で特徴的症状である。
- 1. a, b, c 2. a, b, e 3. a, d, e 4. b, c, d 5. c, d, e

○試験問題番号 16

急性心不全に関する文章の中で間違いはどれか。

- 1 NYHA分類は自覚症状に基づく重症度分類である。
- 2 高度な身体活動の制限があるが、安静時には無症状がないのはNYHA分類Ⅲ度である。
- 3 Killip分類は急性心筋梗塞における心機能障害の重症度分類である。
- 4 うっ血状態で使用される利尿薬はフロセミドが第一選択である。
- 5 Forrester分類は心係数と中心静脈圧で心機能を4つのサブセットに分類してある。